

INFORMACJA

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że na terenie Polski (woj. łódzkie) odnotowano wystąpienie kolejnego ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI). W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bioasekuracji zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768)*.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o obowiązku szczepienia psów powyżej 3. miesiąca życia przeciwko wścieklicznie, zgodnie z *art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075)*. Jeśli posiadacz psa nie zaszczepi go przeciwko wścieklicznie, podlega karze grzywny na zasadach określonych w *ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 z późn. zm.)*.

W najbliższym czasie pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze będą kontrolować wykonanie obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji dotyczącej wysoce zjadliwej ptasiej grypy oraz szczepienia psów przeciwko wścieklicznie.

Sporządził:
podinsp. ds. rolnictwa, leśnictwa i zieleni
Patrycja Kaczmarek

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTORYCH NALEŻY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;**
- 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;**
- 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności